

Elim[®] SP



FUNGICIDA AGRÍCOLA Polvo Soluble SP

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ingrediente activo:

Sulfato de Cobre (pentahidratado).....123 g/kg
Ingredientes aditivos:.....c.s.p. 1 kg

Registro Nacional ICA N° 1232

Titular del Registro: Ceradis Colombia Ltda.

Categoría Toxicológica: III (Ligeramente Peligroso)

Propiedades fisicoquímicas: Polvo soluble, color marrón, estable en condiciones normales.

Densidad 0.54 g/ml, completamente soluble.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Elim[®] SP es un fungicida foliar de contacto y de amplio espectro de acción, que actúa sobre una gran variedad de hongos que ocasionan enfermedades en diversos cultivos. Se recomienda para el control de mildew polvoso causado por el hongo *Oidium spp* en el cultivo de tomate. Se puede aplicar solo o en mezcla con otros fungicidas, cuando es necesario por incremento en la severidad de la enfermedad debido a condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo del patógeno.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/Ha	P.C*	P.R.**
Tomate	Mildew Polvoso (<i>Oidium SPP</i>)	1.6	7 días	4 horas
Rosa S.P.	Mildew Polvoso (<i>sphaerotheca pannosa</i>)	1.6	N.A.	4 horas
Banano	Sigatoka negra (<i>Pseudocercospora fijiensis</i>)	0.8	15 días	4 horas

P.C*: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

P.R:** Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas al área tratada.

N.A: No aplica.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar siguiendo recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

Se recomienda hacer la primera aplicación del producto antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo del patógeno.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA

Los equipos de aplicación deben estar previamente calibrados.

El producto se puede aplicar con cualquier tipo de aspersor, dependiendo de la cantidad de mezcla, el método de aplicación y el área foliar a cubrir. Aplicar siguiendo las recomendaciones de un Ingeniero Agrónomo.

RECOMENDACIÓN PARA PREPARACION DE LA MEZCLA DE Elim[®] SP

Disuelva la cantidad de Elim[®] SP directamente en el tanque de mezcla que contenga 50-75% del volumen total de aplicación. Adicione el producto lentamente y con agitación constante hasta homogenizar, completando el volumen requerido. Cada vez que vaya a llenar el equipo, agite la mezcla.

Debe evitarse el uso de **Elim[®] SP** durante horas de alta radiación solar y altas temperaturas.

VOLUMEN TOTAL En aplicaciones con bomba de motor o espalda se usa un volumen hasta 600 litros/Ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Se recomienda hacer una prueba previa antes de la aplicación. No se presenta fitotoxicidad si es empleado en las dosis y en los cultivos recomendados para su uso.



Ceradis[®] Crop Protection
Green innovations



www.imjagroindustrial.com

FUNGICIDA AGRÍCOLA Polvo Soluble SP

TOXICOLOGIA

Elim® SP No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

"Ceradis Colombia Ltda. Garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones o instrucciones dadas."

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Durante las aplicaciones terrestres "Utilice equipo de protección completo durante la manipulación y aplicación: overol, guantes de neopreno ó PVC, botas de caucho, gorra, anteojos irrompibles y máscara especial para plaguicidas, evite caminar dentro de la neblina de aspersión, no ingresar al área tratada hasta que no se haya secado completamente el follaje.

"No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación"

"Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada y cámbiese"

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado"

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta". Contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua. Consultar con un médico.

Contacto con los ojos: Mantener los ojos abiertos mientras se lavan lentamente con agua durante 15 a 20 minutos. Si se tiene lentes de contacto retirarlos en los primeros cinco minutos y continuar con el lavado de los ojos. Consultar con un médico.

Elim®
SP



En caso de intoxicación por inhalación: retire al afectado a una zona ventilada y mantenga al paciente acostado de medio lado. Solicite asistencia médica inmediatamente.

Ingestión: Consultar con el médico inmediatamente. NO INDUCIR AL VOMITO sin haber consultado con el médico. No suministrar nada oralmente a una persona inconsciente.

GUÍA PARA EL MÉDICO: No tiene antídoto específico. Aplique tratamientos sintomáticos.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS

CISPROQUIM 01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el teléfono 2 88 60 12

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y desecho acorde con la entidad local competente. No utilice el mismo equipo de fumigación para aplicar Elim® SP, en la aplicación de otro plaguicida en cultivos susceptibles o para bañar ganado.

La aplicación de Elim® SP debe ser dirigida al follaje de las plantas. No arrojar producto, desechos de aplicación, ni los envases vacíos a las fuentes de agua. Evite contaminar las aguas que vayan a ser utilizadas para consumo humano, animal o riego de cultivo.

Para la protección de la fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

"Para aplicaciones aéreas y terrestres respetar las franjas de seguridad de 100 y 10 metros respectivamente con relación a los cuerpos del agua"



Ceradis® Crop Protection
Green innovations



AGROINDUSTRIAL

www.imjagroindustrial.com

FUNGICIDA AGRÍCOLA Polvo Soluble SP



ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

- Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicinas de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro fresco y seco).
- Siempre mantenga el producto en su empaque original.

ADVERTENCIA: "NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA DE CONSUMO"

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILICÉLO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha de aprobación ICA: 22/07/2016



Ceradis® Crop Protection
Green innovations



www.imjagroindustrial.com